

mycomate basic mushroom kit

anleitung:



was sie schon haben:

- Tüte mit Wachstumssubstraten & Injektionsseite
- sterile Alkoholstäbchen
- food container
- Tüte mit Vermiculiten
- Fruitingtüte
- SporeMate Sporen Spritze 3ml

was sie noch benötigen:

- sauberer Mixbehälter
- Wassersprüher
- saubere Hände und Umgebung
- Wäscheklammer o. ä.

step a

1- Waschen Sie ihre Hände sehr gründlich (am besten mit anti-bakterieller Seife). Trocken Sie ihre Hände mit sauberen Papiertüchern.

2- Während Sie die Injektionsseite des Substratbeutels in einer Hand halten, nehmen Sie die beiden Plastikklappen mit der anderen Hand und ziehen Sie sanft die Plastikscheibe ab, die die Injektionsseite schützt. Befeuchten Sie die Stelle mit einem frischen Alkoholstäbchen und lassen sie trocknen. (siehe Foto a)

3- Entfernen Sie die Spritze und Nadel von der Tüte sowie den Plastiksenschutz, welcher die Nadel schützt. Die Nadelspitze darf mit nichts in Berührung kommen, da sie sonst noch einmal sterilisiert* werden muss.

* Die Nadel in eine Flamme halten, bis die Nadelspitze rot wird. Achten sie aber darauf, dass es nicht zu einer Überhitzung der Nadel oder zum Schmelzen des Plastik kommt. Lassen Sie die Nadel immer auskühlen bevor sie injizieren. Atmen sie nicht direkt auf die Nadel bzw. die Injektionsseiten.

4- Drücken Sie die Nadel durch die Injektionsseite des Substratbeutels.

step b

Brüten Sie die Substratbeutel im Dunkeln und bei einer Temperatur von 23°-27°C. Innerhalb 24 bis zu 72 Stunden wird der Pilz zum Leben erwachen (in Form von kleinen weißen Baumwollgewächsen).

Kontamination: Falls der Pilzkuchen eine andere Farbe als Weiß annimmt, ist es Kontamination. ÖFFNEN SIE NIEMALS EINEN KONTAMINIERTEN BEUTEL! Entsorgen sie diesen.

step c

1. Waschen und trocken sie ihre Hände gründlich.
2. Geben sie das Vermikulit in einen sauberen Mixbehälter.
3. Fügen sie 100 ml Wasser zu dem Vermikulit. mischen sie das Ganze für einige Minuten miteinander, bis das gesamte Vermikulit komplett durchfeuchtet ist.
4. Verteilen sie das Vermikulit gleichmässig im „food container“
5. Nehmen sie den Pilzkuchen aus dem Beutel.
6. Setzen sie den Pilzkuchen auf das Vermikulit in die Mitte des „food container“.
7. Setzen sie den „food container“ in die Frutingtüte und besprühen sie die Seiten dieser einige male mit Wasser. Falten sie den oberen Teil der Fruktifikationstüte einige male ein und schliessen sie diese mit einer Wäscheklammer oder ähnlichem.
8. Platzieren Sie den Beutel an einem Ort mit indirektem Licht (keine direkte Sonneneinstrahlung). Achten sie auf eine Temperatur von 22° bis 25° C. Die Pilze wachsen besser, wenn die Fruitingtüte durch sanftes Besprühen der Innenseiten feucht gehalten wird. (1 bis 2 Mal am täglich.)
9. Nach wenigen Tagen bis zu zwei Wochen werden die ersten Pilze erscheinen. Sobald sie reif sind, können sie geplückt werden, indem man vorsichtig am Stängel dreh und dann den Pilz aus dem Vermikulit zieht.
10. Halten Sie die Seiten des Fruktifikationsbeutels immer feucht und schon bald wird ein neuer Pilzschwall heranwachsen. Sie können drei oder mehr Pilzschwälle erwarten.

**für mehr informationen besuchen sie unsere websiten
www.mycomate.com und www.sporemate.com**

